

Precauciones e instrucciones de uso. Tirar aquí. 

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Fenhexamida pertenece al grupo químico de las **Hidroxianilidas**.

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación: delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. **Durante su aplicación** en campo o post-cosecha utilizar: overol impermeable, protector facial, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su preparación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento y evitar la deriva a otros cultivos. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave con abundante agua los equipos utilizados en la aplicación.

Protección para el medio ambiente: El producto es tóxico para peces. Prácticamente no tóxicos para aves y abejas. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. A pesar que el producto es prácticamente no tóxico para las abejas, como medida de precaución, se sugiere retirar las colmenas del área de aplicación o bien tapar la entrada de las píqueras, de manera de evitar el contacto directo del producto con las abejas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

EN POST-COSECHA LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA, DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN.

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Teléfonos de emergencia:

- (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. Convenio CITUC/AFIPA
(Atención 24 horas).
(2) 2520 8200 Bayer S.A. (Horario de oficina).



CUIDADO



PRODUCTO: TELDOR 500 SC
ITEM: ETIQUETA Inseal tiro/retiro
Dimensiones: 51 x 15 cm.
Colores: 2
Colores: Pantone 293 C, Pantone negro



Composición

Ingrediente activo:

Fenhexamida* 50 % p/v (500 g/L).
Coformulantes c.s.p. 100 % p/v (1 L).

*2',3'-dicloro-4'-hidroxi-1-metilciclohexanocarboxanilida

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Teldor® 500 SC es un fungicida de contacto y alto poder de penetración, específico para control de botritis en videx, frutas de carozo, berries y tomates. Se recomienda también para el tratamiento en post cosecha de frutos de carozo, videx de mesa y kiwis, de acuerdo a la información presente en el cuadro de instrucciones de uso.

®: Marca Registrada del Grupo Bayer

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2588.

Fabricado por:

Bayer AG
Alfred Nobel Str. 50,
D-40789 Monheim, Alemania.

Bayer S.A.
Carrera 50, calle 8,
Soledad-Atlántico,
Barranquilla, Colombia.

Bayer S.A.S.
1 avenue Edouard Herriot,
69400 Villefranche- Limas,
Francia.

Importado por:

Bayer S.A.
Av. Andrés Bello 2457,
Piso 21, Providencia,
Santiago, Chile.

www.cropscience.bayer.cl

Bayer

Lote de
fabricación:

Fecha de
vencimiento:

Precáuciones y advertencias

Grupo químico: Fenhexamida pertenece al grupo químico de las **Hidroxianilidas**.

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación: delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. **Durante su aplicación** en campo o post-cosecha utilizar: overol impermeable, protector facial, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su preparación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento y evitar la deriva a otros cultivos. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del trabajo, lavar prolíjamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave con abundante agua los equipos utilizados en la aplicación.

Protección para el medio ambiente: El producto es tóxico para peces. Prácticamente no tóxicos para aves y abejas. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. **A pesar que el producto es prácticamente no tóxico para las abejas, como medida de precaución, se sugiere retirar las colmenas del área de aplicación o bien tapar la entrada de las piqueras, de manera de evitar el contacto directo del producto con las abejas.**

Almacenamiento: Transportar, comercializar y almacenar el producto solamente en su envase original bien cerrado y provisto de su etiqueta. Conservar bajo llave en lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado, exclusivo para productos fitosanitarios y de acceso restringido.

Instrucciones para realizar triple lavado de envases: Vacíe el envase en el estanque pulverizador y manténgalo en posición de descarga 30 segundos; a continuación agregue agua hasta un cuarto (1/4) de la capacidad del envase. Luego cierre el envase y agite durante 30 segundos; vierta el agua en el equipo pulverizador y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar este procedimiento tres veces. Finalmente, perfore el envase para evitar su reutilización.

Síntomas de intoxicación: No presenta una sintomatología característica a causa de intoxicación.

Primeros auxilios: Procure atención médica inmediata en todos los casos. Retirar al afectado de la zona de peligro o exposición. Retirar las ropas contaminadas inmediatamente. **En caso de ingestión**, NO inducir el vómito; mantener al afectado en descanso y obtener atención médica. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En caso de contacto con los ojos**, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Consultar a un especialista. **En caso de**

contacto con la piel, retirar ropa y zapatos. Lavar profusamente las partes del cuerpo afectadas con agua y jabón. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre el pelo, uñas y pliegues. **En caso de inhalación**, remover al afectado al aire fresco, manteniéndolo en reposo y abrigado. Si la persona no respira otorgar respiración artificial

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de ingestión, remover el producto ingerido del estómago y seguir tratamiento sintomático.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

EN POST-COSECHA LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA, DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Teléfonos de emergencia:

(2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. Convenio CITUC/AFIPA
(Atención 24 horas).

(2) 2520 8200 Bayer S.A. (Horario de oficina).

Nota al comprador: A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente, todos los riesgos de su uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustraen de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los países de destino.

Instrucciones de uso

Primer fungicida del grupo químico de las hidroxianilidas, específico para control de botritis en vides, frutales de carozo, berries, kiwis y tomates, de acuerdo a la información presente en el cuadro de instrucciones de uso. Ejerce su acción por contacto y presenta un sobresaliente efecto residual debido a sus propiedades lipofílicas que lo fijan sobre los tejidos vegetales, disminuyendo su degradación por luz y agua libre. No presenta resistencia cruzada con botriticidas de otros grupos químicos. No altera fermentaciones ni atributos de vinos.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Concentración/Dosis	Observaciones
Vides de mesa, Vides para pisco, Vides para vino (parronal español).	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,2 L/ha	Aplicar vía líquida en estadios críticos, con condiciones favorables para la enfermedad, (flor, cierre de racimos, pinta y precosecha). Alternar con otros fungicidas de diferente grupo químico. En parronal español utilizar volúmenes de agua de 800 a 1800 L/ha. En vides para vino es posible realizar la última aplicación un día antes de cosecha, sin alterar la fermentación.
Vides para vino (espaldera).		0,8 L/ha	En vides en espaldera, se sugiere utilizar volumen de aplicación de 1.000 L/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días. Para maquinaria de bajo volumen (menos de 500 L de agua por hectárea) considerar dosis 1,2 L/ha para parronal español y 0,8 para conducción en espaldera.
Vides de mesa (post-cosecha).	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,2 L/100 L de agua	Aplicación de post-cosecha en vides de mesa: en tratamiento vía líquida, sólo con sistema Typhoon® Services.
Tomates.	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,4 - 1,0 L/ha	Aplicar en aspersión foliar en estadios críticos, con condiciones favorables para la enfermedad. Para cultivos bajo invernadero, utilizar volúmenes de aplicación de 500 a 1.000 L/ha, mientras que para cultivos al aire libre utilizar volúmenes de agua de 500 a 800 L/ha. Utilizar la dosis menor (0,4 L/ha) para volúmenes de aplicación menores a 600 L/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días, alternando con fungicidas de distinto grupo químico.
Frambuesos, Arándanos, Cranberries, Frutillas.	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 cc/100 L de agua	Aplicar en estadios críticos, con condiciones predisponentes favorables para el desarrollo de la enfermedad, especialmente en floración y precosecha. Considerar volumen de aplicación de 500 a 1.000 L de agua/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días.
Ciruelos, Cerezos, Damascos, Duraznos, Nectarinos.	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,2 L/ha	Aplicar en estadios críticos, con condiciones predisponentes favorables para el desarrollo de la enfermedad especialmente en floración y/o pre-cosecha. Se sugiere utilizar un volumen de aplicación de 1.000 a 1.500 L de agua/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días, alternando con fungicidas de distinto grupo químico.
Damascos, Duraznos, Nectarinos, Ciruelos, Plumcots, Cerezos.	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	180 cc/100 L de agua, 100 L de emulsión cera-aceite ó 100 L de dilución acuosa de cera-aceite	Tratamiento de post-cosecha: Tratamiento por aspersión en línea de selección o por inmersión de frutos en la suspensión por 1 minuto. Aplicación de alto volumen (diluido) para 24.000 Kg de fruta. En cerezas: tratamiento de postcosecha, utilizando dosis indicada para 3.000 Kg de fruta.
Kiwis	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,2 L/ha	Aplicar en estadios críticos, con condiciones predisponentes favorables a la enfermedad, especialmente en floración y/o pre-cosecha*. Se sugiere utilizar un volumen de aplicación de 1.000 a 1.500 L de agua/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días, alternando con fungicidas de distinto grupo químico.
		180 cc/100 L agua	Aplicación de postcosecha en tratamiento de inmersión. La fruta deberá permanecer inmersa en la solución por 2 - 3 minutos. Dosis indicada para 24.000 Kg de fruta. Realizar máximo una aplicación durante la temporada.

No efectuar más de una aplicación en los tratamientos de postcosecha.

* Se sugiere utilizar con coadyuvante Induce pH 900 SL, de acuerdo a la concentración indicada en su etiqueta.

Período de Carencia: Tomates, ciruelos, cerezos, damascos, durazneros, nectarines, plumcots, frambuesos, cranberries, arándanos, frutillas, kiwis, vides de mesa, vides para vino y para pisco: 1 día. Aplicaciones de post cosecha (duraznos, damascos, nectarinos, ciruelos, cerezos, plumcots, kiwis y vides de mesa): 0 días. Los productos tratados pueden ser consumidos inmediatamente o en los meses posteriores al almacenamiento.

Bajo ciertas condiciones naturales, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o diferente sensibilidad a fungicidas, por lo tanto esto puede ocurrir a **Teldor® 500 SC** como a otros productos de su mismo grupo químico, a través de una variación genética normal en cualquier población de hongos fitopatógenos. Estas razas resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de fungicidas y la población llegará a ser de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **Teldor® 500 SC**, por lo que Bayer no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza. **Fenhexamid**, de acuerdo a la clasificación **FRAC** pertenece al **Grupo G/IBE. Clase III**.

Importante:

- Calibrar el equipo de aplicación antes de utilizar.
- Evitar deriva y exposición a operarios y otras personas.
- No aplicar sobre cultivos afectados por sequías, heladas o cualquier otro stress físico o químico.
- No aplicar con pronóstico de lluvia inminente.
- De preferencia, para una aplicación segura y eficaz aplicar con una brisa ligera (3-7 km/h) y siempre en dirección del sentido del viento.
- Evitar realizar las aplicaciones en las horas de máximo calor.

Preparación de la mezcla: Agitar antes del uso. Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **Teldor® 500 SC** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

Incompatibilidades: No aplicar en mezcla ni en aplicaciones consecutivas con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

Compatibilidades: Compatible con Confidor 350 SC, Confidor 200 SL, Movento 100 SC, Horizon 25% WP, Flint 50% WG, Induce pH 900 SL, Ácido Giberélico (en diversas formulaciones) y con varios de los productos fitosanitarios de uso común. Al realizar una mezcla no conocida, se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad y miscibilidad. Ante la duda sobre mezclas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas y a las instrucciones de esta etiqueta.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta transcurridas dos horas después de la aplicación verificando que la aspersión aplicada se haya secado sobre la superficie tratada. Para animales, no corresponde indicar un tiempo de reingreso ya que los cultivos indicados no se destinan a uso animal.

Precauciones y advertencias

Grupo químico: Fenhexamida pertenece al grupo químico de las **Hidroxianilidas**.

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación: delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. **Durante su aplicación** en campo o post-cosecha utilizar: overol impermeable, protector facial, guantes impermeables (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su preparación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento y evitar la deriva a otros cultivos. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Despues del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave con abundante agua los equipos utilizados en la aplicación.

Protección para el medio ambiente: El producto es tóxico para peces. Prácticamente no tóxicos para aves y abejas. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. A pesar que el producto es prácticamente no tóxico para las abejas, como medida de precaución, se sugiere retirar las colmenas del área de aplicación o bien tapar la entrada de las piqueras, de manera de evitar el contacto directo del producto con las abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

EN POST-COSECHA LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA, DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Teléfonos de emergencia:

- (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la P.U.C. Convenio CITUC/AFIPA
(Atención 24 horas).
(2) 2520 8200 Bayer S.A. (Horario de oficina).

Edición 26/02/2025



CUIDADO



PRODUCTO: TELDOR 500 SC

ITEM: ETIQUETA (base inseal)

Dimensiones: 26,5 x 15 cm.

Colores: 2

Colores: Pantone 293 C, Pantone negro